

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS



RASO 35 SC

HERBICIDA - CARBOXÍLICO
QUINCLORAC

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 1.09 – 1.15 mg/l a 20° C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑO A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN



MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS

USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

RASO 35 SC, es un herbicida sistémico, selectivo para el cultivo de arroz, postemergente rápidamente absorbido por las raíces y a través del follaje de las plantas. Actúa como inhibidor de la pared celular.

EQUIPO DE APLICACIÓN: El producto se debe aplicar con adecuado volumen de agua para cubrir de forma uniforme el follaje de los cultivos a tratar. La aplicación terrestre puede hacerse con tractor, aspersora manual o equipo de motor. Debe asegurarse que los equipos y boquillas estén en buen estado y calibrados para una buena distribución y tamaño de la gota uniforme. Durante la aplicación usar traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek, máscara con filtro, antiparras, guantes y botas de goma. Antes y después de ser usado, el equipo de aplicación debe ser lavado cuidadosamente con agua y jabón.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y termine de llenar el volumen del tanque de aplicación. Mantenga en agitación constante la mezcla dentro del tanque. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día. Durante la manipulación del concentrado usar delantal, protector facial, guantes y botas de goma. Los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo.



RECOMENDACIONES DE USO

MALEZAS QUE CONTROLA:

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
Zacate pinto, pie de gallo	<i>Echinochloa colonum</i>
Zacate de Agua, tuba crédito	<i>Echinochloa crus-galli</i>
Campanilla	<i>Ipomoea spp</i>
Vaina larga	<i>Cassia spp</i>
India	<i>Aeschynomene spp</i>
Acantospermo	<i>Acanthospermum hispidum</i>
Altamisa	<i>Ambrosia artemesifolia</i>
Mozote	<i>Bidens pilosa</i>
Papacuyo	<i>Galinsoga spp</i>
Malva	<i>Hibiscus trionum</i>
Branquiaria	<i>Brachiaria platyphylla</i>
Dormilón	<i>Cassia spp</i>
Pajilla blanca	<i>Digitaria sanguinalis</i>
Tamarindito	<i>Sesbania exaltata</i>

CULTIVOS:

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
Arroz	<i>Oryza sativa</i>

DOSIS RECOMENDADAS: En arroz 0.85- 1.0 l/ha.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Se aplica una sola vez. Realizar la aplicación de 8-15 días después de germinado o bien cuando las malezas gramíneas y de hojas anchas tengan de 2-4 hojas.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 45 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Esperar 24 horas después de la aplicación o hasta que haya secado el rocío de la aspersión.

FITOTOXICIDAD: No causa fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen finalmente las instrucciones de esta etiqueta.

COMPATIBILIDAD: **RASO 35 EC** no es compatible con productos fuertemente alcalinos. No aplicar fungicidas, insecticidas o fertilizantes líquidos 14 días antes o después de aplicar **RASO 35 EC** en combinación con propanil. Cuando se aplica conjuntamente con propanil no es conveniente combinar con insecticidas fosforados o carbamatos. No mezclar con herbicidas hormonales.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Los usuarios deben lavarse bien las manos antes de comer, beber, mascar chicle, fumar o ir al baño. No trabajar en la neblina del líquido o con viento. Para la mezcla, aplicación del producto y lavado de equipo de aplicación, use la ropa de protección: sombrero, protector de ojos, mascarilla, camisa manga larga y pantalón largo, guantes y botas de hule. El filtro de la mascarilla debe cambiarse a menudo. Evitar el contacto directo con el producto. Evite aspirar la llovizna de aspersión. Bañarse con eficiente agua y jabón después de la jornada de trabajo y póngase ropa limpia. Use ropa limpia en cada jornada de trabajo. No lave la ropa de trabajo y equipo de protección junto con la ropa de uso normal.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacénelo bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO
Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUÉS
DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**



SINTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Si bien no se conocen los síntomas de intoxicación en humanos, se puede esperar los siguientes provocados por los componentes secundarios de la formulación: irritación ocular y dificultad de las vías respiratorias, vómitos y dolores digestivos y deshidratación.

PRIMEROS AUXILIOS

Por ingestión: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica. **Por contacto con la piel:** Quítense inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga ayuda médica. **Por contacto con los ojos:** Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Véase el médico. **Por inhalación:** Traslade al paciente a un lugar no contaminado y manténgalo en reposo. Obtenga ayuda médica.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico. El tratamiento deberá ser sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar. (Morgan) 684-3478 / 684-3672
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello 681-2913 / 681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO
O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado" y luego deben destruirse y enterrarse a una profundidad no menor de 40 cm, lejos de fuentes de agua y casas de habitación. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

**EL USO DE LOS ENVASES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTIA: La compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase original bien cerrado y con sello de garantía inalterado. Garantizamos el contenido del producto de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado en el pan fleto. El consumidor adquiere el producto con el pleno conocimiento de ello, debido a estos factores. Se garantiza asimismo la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre sellado.

FABRICADO Y/O FORMULADO POR:

AGRÍCOLA NACIONAL S.A.C. e.I.
Almirante Pastene 300, Santiago Chile
Tel: 562 4706800 Fax: 562 2358634

REGISTRADO Y/O IMPORTADO POR:

ANASAC DOMINICANA S.R.L.
Avenida Ortega y Gasset N°2, El vergel
Santo Domingo, Rep. Dominicana

DISTRIBUIDO POR:

PAÍS
CHILE
REP. DOMINICANA

NÚMERO DE REGISTRO
3405
3858

FECHA DE REGISTRO
04-04-2011
11-01-2012

Número de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento: